



## مقدمه

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی سرطان دومین عامل مرگ و میر در جهان پس از بیماری های قلبی و عروقی و سومین عامل مرگ و میر در ایران می باشد. به طور کلی پذیرفته شده است که افکار خودکشی و نشخوار فکری بر فرآیند درمان بیماری سرطان موثر است. از طرفی به نظر می رسد که درک بیمار از بیماری خود و حمایت های اجتماعی از او از عوامل پیش بینی کننده افکار خودکشی و نشخوار فکری در این بیماران است. در این مطالعه به بررسی تاثیر درک از بیماری و حمایت های اجتماعی بر میزان افکار خودکشی و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به سرطان پرداختیم.

## پیش بینی افکار خودکشی و نشخوار فکری بر اساس درک از بیماری و حمایت اجتماعی در بیماران سرطانی مراجعه کننده به مرکز جامع سرطان بیمارستان بعثت و مهدیه شهر همدان

### روش کار

این پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام بیماران مبتلا به سرطان بزرگسال شهر همدان در سال 2024 بود که تعداد 250 نفر از بیماران، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس سنجش افکار خودکشی (BSSI)، پرسشنامه نشخوار فکری نالن هوکسما و مارو ، پرسشنامه ادراک بیماری (BIPQ)، پرسشنامه حمایت اجتماعی (SS-A) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با کاربرد نرم افزار SPSS-26 استفاده شد.



## کلام آخر

با توجه به این مطالعه اینگونه استنباط می‌شود که ادراک بیماری و حمایت اجتماعی می‌تواند افکار خودکشی و نشخوار فکری را در بیماران سرطانی پیش بینی کنند. در سطح بالینی، یافته‌های این مطالعه بر لزوم در نظر گرفتن عوامل روان‌شناختی مانند ادراک بیماری و حمایت اجتماعی در فرآیند درمان بیماران سرطانی تاکید دارد.

نتایج این مطالعه نشان داد که ادراک بیماری و حمایت اجتماعی می‌تواند افکار خودکشی و نشخوار فکری را در بیماران سرطانی پیش بینی کند. در سطح بالینی، یافته‌های این مطالعه بر لزوم در نظر گرفتن عوامل روان‌شناختی مانند ادراک بیماری و حمایت اجتماعی در فرآیند درمان بیماران سرطانی تاکید دارد.



## نتایج مطالعه

این مطالعه، در فروردین 1403 تا شهریور 1403 به مدت 6 ماه در شهر همدان صورت گرفت ، با 250 فرد مبتلا به سرطان مصاحبه شد نتایج نشان داد که حمایت اجتماعی ( $\beta=-0.458, p<0.000$ ) و ادراک بیماری ( $\beta=0.168, p=0.003$ )، پیش بینی کننده های مهم افکار خودکشی هستند. همچنین افزایش درک بیماری ( $\beta=0.242, p=0.000$ ) می‌تواند منجر به افزایش نشخوار فکری ( $\beta=-0.379, p=0.000$ ) شود، در حالی که حمایت اجتماعی ( $\beta=-0.379, p=0.000$ ) نقش محافظتی در کاهش نشخوار فکری دارد.

مشارکت کنندگان

محمدسروش آگاه عبدالعظیم صدیقی

پاشاکی

زهرا تسلیمی

بهناز الافچی

آریا حدادی

سعید یزدی راوند