



دانشگاه علوم پزشکی همدان
معاونت تحقیقات و فناوری

بررسی سطح سواد سلامت و عوامل مؤثر بر آن در خصوص پاپیلومای ویروس انسانی (HPV) در مراجعه کنندگان به بیمارستان فاطمیه، شهر همدان

یک مطالعه ی مقطعی طی سال های ۱۴۰۴-۱۴۰۵


سال انجام طرح: ۱۴۰۵

مقدمه

ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) شایع ترین عفونت مقاربتی در جهان بوده و عامل اصلی سرطان دهانه رحم و سایر سرطان های مرتبط محسوب می شود. سواد سلامت نقش محوری در پیشگیری از این عفونت، پذیرش واکسیناسیون و بهره مندی از خدمات غربالگری دارد. با توجه به شواهد محدود در این زمینه در جمعیت های بالینی ایران، این مطالعه با هدف تعیین سطح سواد سلامت مرتبط با HPV و شناسایی عوامل مؤثر بر آن طراحی شد.

روش انجام مطالعه

این مطالعه توصیفی-تحلیلی با طراحی مقطعی بر روی ۳۰۰ نفر از مراجعه کنندگان به بیمارستان فاطمیه و مطب های متخصصین زنان شهر همدان طی سال های ۱۴۰۴-۱۴۰۵ انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته با سه حیطه دانش پایه (۱۶ سؤال)، دانش غربالگری (۶ سؤال) و دانش واکسیناسیون (۷ سؤال) بود که روایی و پایایی آن تأیید شده بود. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ۲۲، آزمون های ANOVA، تی تست، کای اسکور و رگرسیون خطی چندگانه تحلیل شدند. سطح معنی داری داده $P < 0.05$ در نظر گرفته شد.




دکتر سیما کامکار

دکتر انسیه جنابی

دکتر فاطمه شهبازی

محمد توسلی



سطح سواد سلامت مرتبط با HPV در جمعیت مورد مطالعه سطح متوسط رو به پایین است. به ویژه در حیطه های غربالگری و واکسیناسیون. سطح تحصیلات تنها پیش بین مستقل و معنادار سواد سلامت در مدل چندگانه بود. طراحی مداخلات آموزشی هدفمند در مراکز بهداشتی، به ویژه برای زنان خانه دار و افراد با تحصیلات پایین، ضروری به نظر می رسد.

نتایج مطالعه

میانگین سنی شرکت کنندگان ۳۱,۹۴ سال بود و ۹۶,۶۷٪ را زنان تشکیل می دادند. میانگین نمره کل سواد سلامت ۱۴,۴۷ از حداکثر ۲۹ به دست آمد که نشانگر سطح متوسط رو به پایین است. حیطه دانش پایه (۹,۵۸ از ۱۶)، دانش واکسیناسیون (۲,۶۶ از ۷) و دانش غربالگری (۲,۲۳ از ۶) به ترتیب بیشترین و کمترین نمره را داشتند. بین گروه های سنی از نظر دانش غربالگری تفاوت معناداری مشاهده شد ($p=0.009$).