نمونه پیام پژوهشی جهت انتشار (۱)

عنوان پیام پژوهشی

داروهای بیولوژیک نسبت به سایر داروها برای پاک کردن لکه‌های پسوریازیس روی پوست می توانندکارایی بهتری داشته باشند.

پیام کلیدی:

- به نظر می‌رسد پس از شش ماه درمان، داروهایی تحت عنوان «بیولوژیک » برای پاک کردن لکه‌های پسوریازیس روی پوست بهترین کارآیی را از خود نشان می‌دهند .
- برای ارزیابی فواید و مضرات بالقوه درمان طولانی-مدت‌تر با داروهای خوراکی یا تزریقی درمان پسوریازیس، انجام مطالعات طولانی-مدت‌تر مورد نیاز است .
- انجام مطالعات بیشتری برای مقایسه مستقیم این نوع داروها در مقابل یکدیگر ضروری است.

متن پیام پژوهشی

پژوهش حاضر به بررسی درمان‌های سیستمیک برای کنترل پسوریازیس پرداخته است. با توجه به اینکه حدود ۱۰٪ تا ۲۰٪ از بیماران مبتلا به پسوریازیس نیاز به درمان‌های مؤثر دارند، این مطالعه به دنبال شناسایی فواید و مضرات داروهای مختلف سیستمیک بوده است. سه نوع داروی سیستمیک شامل بیولوژیک‌ها، مولکول‌های کوچک و داروهای غیر بیولوژیکی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که تمامی داروهای آزمایش شده عملکرد بهتری داشتند. داروهای بیولوژیکی، به ویژه آن‌هایی که اینترلوکین‌های ۱۷، 23و TNF-alpha را هدف قرار می‌دهند، در درمان پسوریازیس مؤثرتر از داروهای غیر بیولوژیکی بودند. چهار داروی بیولوژیکی شامل اینفلیکسیماب، ایکسیکیزوماب، بیمکیزوماب و ریسانکیزوماب بهترین نتایج را نشان دادن.د این پژوهش به وضوح نشان می‌دهد که انتخاب درمان مناسب برای بیماران مبتلا به پسوریازیس می‌تواند تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی آن‌ها داشته باشد و نیاز به تحقیقات بیشتری در زمینه ایمنی و اثربخشی این درمان‌ها احساس می‌شود.

تاثیرات و کاربردهای آن

این پژوهش به وضوح نشان می‌دهد که داروهای بیولوژیکی عملکرد بهتری نسبت به داروهای غیر بیولوژیکی دارند. نتایج این مطالعه می‌تواند به پزشکان در انتخاب بهترین گزینه‌های درمانی کمک کند و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوریازیس را تسهیل نماید. و همچنین نیاز به تحقیقات بیشتر در زمینه عوارض جانبی و ایمنی داروها را نمایان می‌سازد.

محدودیت‌های شواهد چه بودند؟

- ذکر این نکته مهم است که در حالی که سطح کیفیت مطالعاتی که به مقایسه داروهای ضدافسردگی پرداختند قابل قبول بود، سطح کیفیت مطالعاتی که بنزودیازپین‌ها را با داروهای ضدافسردگی مقایسه کردند، پائین بود. این امر ممکن است قطعیت نتایج را محدود کند .
- این مرور محدودیت‌هایی دارد زیرا بر مطالعات کوتاه‌مدت استوار است.

مخاطبان طرح پژوهشی:

- گیرندگان خدمات سلامت (مردم، بیماران، رسانه‌ها)

- ارائه‌کنندگان خدمات سلامت (پزشکان، داروسازان، پرستاران، ماماها و ...)
- مدیرانو سیاست‌گذاران نظام سلامت (مدیران بیمارستان، دانشگاه، سازمان‌غذا و دارو، معاونت بهداشتی و ...)

آیا این خبر می‌تواند از نظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی ، ارزش های دینی و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتی داشته‌باشد؟

از نظر سازمان غذا و دارو و همچنین از نظر تبعات اجتماعی، درمان مؤثر پسوریازیس می‌تواند تأثیرات مثبتی بر روی کیفیت زندگی بیماران داشته باشد.

در صورتی که این طرح منتج به مقاله شده است لینک مقاله درج شود:.....http://www

ایمیل ارتباطی و تلفن مجری اصلی طرح:

منابع و مراجع : ۴ مرجع اصلی استفاده شده در طرح تحقیقاتی مورد نظر را ذکر نمایید.