



دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاونت تحقیقات و فناوری

اداره کاربست نتایج تیر ۹۹

- ۱- در کشورهای در حال توسعه به مطالعه عوامل مرتبط با شدت حوادث ترافیکی توجه کافی نشده است.
- ۲- خاطره گویی بر احساس تنهایی و سلامت معنوی در بیماران سالخورده تاثیر مثبت داشت.
- ۳- در بیماران پسوریازیس بعد از درمان موضعی، سطح اینتر لوکین ۴ افزایش یافت.
- ۴- رزوراترول در کاهش آسیبهای بافت کلیه و کاهش استرس اکسیداتیو رت های تحت درمان نقش موثری داشت.
- ۵- استفاده از محافظ های دهانی میتواند میزان وقوع آسیبهای دندانی را در کودکان ورزشکار کاهش دهد.
- ۶- پرستارانی که از بیماران کرونایی مراقبت میکنند، ممکن است علایم استرس واضطراب و افسردگی را تجربه کنند
- ۷- فرسودگی شغلی پرستاران و میزان استرس شغلی آنها در حد متوسط است.
- ۸- رفتار مناسب پرستاران با دانشجویان و بیماران، ارتقا کیفیت مراقبت پرستاری و فضای آموزشی بالینی را در پی دارد.
- ۹- اختلال خواب در زنان سالمندی که شاغل بوده اند، کمتر است.
- ۱۰- نرم افزار بانک اطلاعات مدیران در سطح دانشگاه علوم پزشکی همدان به بهره برداری رسید.

۱۱- شانس ابتلا به کووید ۱۹ در زنان باردار با سطح تحصیلات بالاتر، بیشتر از زنان با سطح تحصیلات پایین است.

۱۲- بعد از بلیچ یا سفید کردن دندان تابش بعضی از لیزرها میتواند ریز سختی مینا را افزایش دهد.

۱۳- میزان دقت تطابق لبه ای اسکنرهای دندانپزشکی متفاوت است.

۱۴- شیوع واقعی بیماری کووید ۱۹ در جمعیت عمومی استان همدان نسبت به موارد گزارش شده و آمارهای رسمی بسیار بالاتر است.

۱۵- یکی از نتایج طبیعی اجرای اصول تولید ناب، کاهش خطرات شغلی و خطای انسانی است.

اداره کاربست نتایج مرداد ۹۹

۱- بیماری کرونا و ویروس در بین نوزادان خفیف تر و پیش آگهی بهتر نسبت به بزرگسالان دارد و احتمال انتقال داخل رحمی به نوزاد وجود دارد.

۲- عوامل قادر ساز رابطه مستقیمی با سطح فعالیت فیزیکی زنان شاغل در علوم پزشکی همدان دارد.

۳- در نیازسنجی سلامت سال ۹۸ شهرستان همدان، تغذیه سالم به عنوان الویت بهداشتی شناخته شد

۴- مشاوره روان پرستاری باعث افزایش عزت نفس و بهبود رفتارهای ارتقا دهنده سلامتی در بیماران دریافت کننده الکتروشوک درمانی میگردد.

۵- شیوع بیماریهای پوستی مربوط به استفاده از اقدامات محافظتی در بین کارکنان بیمارستانها زیاد است.

۶- سلامت درک شده توسط افراد سالمند متأثر از عواملی مانند، تحصیلات، وضعیت تاهل، فرزندان و رضایت از زندگی است. لذا لازم است فرهنگ سازی جهت تسهیل ازدواج سالمندان انجام گیرد.

۷- ایجاد ایمنی علیه پورفیروموناس ژنژیوالیس در جلوگیری از پیشرفت پریدونتیت موش صحرائی، باعث

پیشگیری از تحلیل

استخوان شد.

۸- از آپتاسنسور سنتز شده بدلیل حساسیت بالا و بازیابی مناسب میتوان برای اندازه گیری کانامایسین در نمونه های بیولوژیکی استفاده کرد.

۹- افزایش سواد رسانه ای مرتبط با بیماری کرونا، میتواند میزان اضطراب در دانشجویان را کاهش دهد.

۱۰- یکی از راههای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از پره اکلامپسی در زنان پر خطر، کنترل رژیم غذایی و کاهش استرس است.

۱۱- رژیم غذایی مناسب و کاهش استرس میتواند خطرات ایجاد و بروز پره اکلامپسی را کم کند.

۱۲- کتاب برنامه استراتژیک ۴ ساله (۱۳۹۷-۱۴۰۰) دانشگاه علوم پزشکی همدان منتشر شد.

۱۳- میزان ابتلا به کووید ۱۹ در زنان، ساکنین مناطق شهری، سالمندان بالای ۶۰ سال و کسانی که در شهرستانهای همدان، نهاوند و ملایر سکونت دارند بالاتر است.

۱۴- با توجه به نگرانی و استرس والدین و دانش آموزان و معلمان از طرح فاصله گذاری اجتماعی و بازگشایی مجدد مدارس در دوران شیوع کرونا، لازم است سلامت روان این افراد باید مد نظر قرار گیرد.

۱۵- داروی میسل دکستران استئارات حاوی پاکلی تاکسل اثر سایتوتوکسیتی بهتری نسبت به پاکلی تاکسل به تنهایی روی سلولهای سرطان سینه دارد.

۱۶- رعایت اصول اخلاقی حاکم بر تحقیقات کارآزمایی بالینی برای پیشگیری از انحراف در این زمینه ضروری است.

۱۷- متولیان سلامت و مدیران بیمارستان ها باید زمینه را برای ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار و کاهش حوادث ناخواسته فراهم کنند.

۱۸- عملکرد ژل جدا کننده سرم خون تولید شده در داخل کشور بررسی گردید و مشخص شد جایگزین بسیار مناسبی برای نوع وارداتی است.

۱۹- جهت سلامت روحی و روانی در بین خانواده بیماران دچار مرگ مغزی لازم است برنامه های توانبخشی و حمایتی

روحی در نظر گرفته شود

۲۰- شاخص کیفیت مواد مغذی آبهای بطری شده در ایران نشان می‌دهد، پارامترهای نیترات، سدیم، سختی و بیشتریت تاثیر را بر شاخص BWQI دارند.

۲۱- ارتقای آگاهی و آموزش مردم در مورد مراقبت های بهداشتی اولیه، ارتقای انگیزش کارکنان و بهبود عملکرد مدیریتی از راهکارهای ارتقا کیفیت خدمات بهداشتی اولیه است

۲۲- به کار بردن مهار کننده های اختصاصی زنجیره دی ان ای، جهت تغییر در بیان ژنهای خاص، در کنترل بیماریها از جمله سرطان موثر است

۲۳- پیگیری و درمان زودهنگام ناباروری بر نتیجه درمان و کاهش هزینه های آن موثر است.

۲۴- یکی از مهمترین عوامل درگرایش زنان به مصرف قلیان عوامل بین فردی مانند نقش خانواده، دوستان یا همسر میباشد. باید مهارت نه گفتن تقویت شود

۲۵- افزایش جذب آهن در باکتری سودوموناس آئروژینوزا، باعث افزایش مقاومت به آنتی بیوتیک می شود

اداره کاربست نتایج شهریور ۹۹

۱- مشارکت اجتماعی سالمندان شهر همدان بسیار پایین است لذا فراهم نمودن بستر مشارکت برای این گروه توسط نهادهای متولی ضروری است.

۲- تابش نور قرمز برای تسریع حرکات دندانی و بهبود ترمیم زخم ها موثر است.

۳- در مطالعه قند و لیپید تهران با استفاده از روشهای یادگیری ماشین متغیرهای دیابت، شاخص توده بدنی، سن و جنسیت به ترتیب چهار متغیر پر اهمیت در ابتلا به سندروم متابولیک میباشد.

۴- توجه ویژه به ثبت صحیح علل سه گانه مرگ (زمینه ای-بینابینی و نهایی) جهت استفاده مناسب مسئولین کشوری در ارائه آمار و ارقام علل مرگ در کشور ضروری است.

۵- عفونت بروسلا در زنان باردار میتواند بروز سقط جنین را افزایش و وزن هنگام تولد نوزادان را کاهش دهد.

۶- الاژیک اسید بعنوان یک ترکیب با منشا گیاهی باعث کاهش درد در رتهای دیابتی شده گردید.

۷- در هنگام شیوع ویروس انفلوآنزای ان ۱اچ ۱ پایش مقاومت نسبت به داروی استراتژیک اوسلتامیویر در نمونه های گرفته شده ضروری میباشد.

۸- با انجام مطالعه ای در دانشگاه علوم پزشکی همدان عوامل خطر مرتبط بر مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در استان مشخص شدند.

۹- عصاره گیاهان بومادران، گزنه و بابا آدم در جهت رفع برخی از مشکلات بافتی ناشی از دیابت تایپ ۲ بخصوص در پانکراس و کلیه در رت های نر دیابتی شده مفید بود.

۱۰- روش سریع ارزیابی و مدیریت ریسک افراد مشکوک به آلودگی با ویروس کرونا در محیطهای کار طراحی و اجرا گردید.

۱۱- پیش بینی احتمال خطای انسانی در عملیات جرثقیل برجی و ارائه راهکارهای آموزشی می تواند قابلیت اطمینان انسان را افزایش دهد.

۱۲- FAM ابزاری بومی و کاربردی برای ریشه یابی علل حوادث است، که میتوان از ان در سازمانها و صنایع استفاده کرد

۱۳- گروه های خودیار میتواند نقش مهمی در بهبود خودمراقبتی در بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن شهر همدان داشته باشد.

۱۴- مداخله تغذیه ای بموقع میتواند از بروز کاهش وزن بحرانی ضمن پرتو درمانی سرطانهای سر و گردن جلوگیری نماید.

۱۵- فراهم کردن محیطی آرام و داشتن الگوی خواب مناسب می تواند سلامت کودکان را به نحو موثری تضمین کند.

۱۶- مصرف چای سبز در بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک میتواند با تنظیم سیکل قاعدگی و کاهش فشارخون و افزایش انسولین همراه باشد.

۱۷- ریسک اثرات بهداشتی و سرطان‌زایی در کلیه برندهای سیگار مورد مطالعه از حدود توصیه شده بالاتر می‌باشد.

۱۸- به نظر میرسد تیتراژ آنتی بادی بوردتلا پرتوزیس و نتیجه کلونیزاسیون گلو با ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس ارتباط نداشته باشد.

۱۹- تحصیلات زنان، استفاده از رسانه‌های ارتباط جمعی، استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری و سزارین از جمله فاکتورهای تاثیرگذار بر طولانی شدن فاصله بین بارداری‌های زنان می‌باشد.

۲۰- بررسی PCR HPV میتواند موثرتر از پاپ اسمیر جهت پیشگیری باشد و در زنان بی علامت میتوان HPV را زودتر از بروز علائم شناسایی کرد.